

# 確かな効き目と、高い安全性!!

———— 製品のご案内 ————



**土壤処理用ZT** フロアブル剤  
**木部処理用20EC** 乳剤

# 高い安全性のフロアブル剤

モクボー

# オプティガード®

## 土壌処理用ZT フロアブル剤



### 製品の概要


有効成分	チアメトキサム(防蟻)	20w/w%
剤型	フロアブル剤	
外観	類白色～褐色 水和性粘稠懸濁液体	
消防法	非該当	
毒劇物取締法	非該当	
改正建築基準法	シックハウス13指定物質を含みません	

(公社)日本しろあり対策協会認定  
(公社)日本木材保存協会認定



### 使用方法

- オプティガード®ZT 1kgを水199ℓで希釈した200倍希釈液を帯状散布法で5ℓ/㎡、面状散布法で3ℓ/㎡となるように土壤に散布してください。
- ご使用前は、フロアブル剤のため容器をよく振り混せてください。
- 希釈液を静置後の使用の際も、再攪拌してからご使用ください。
- 基本的には、希釈液は調製したその日のうちに使いきってください。
- 他剤との混用は避けてください。
- 食品、食器、飼料、玩具、寝具、衣類、愛玩動物、家畜、観賞魚、植物、貴重品、美術品、楽器、電気製品等はあらかじめ移す、あるいは格納し、本剤がかかるないようにしてください。
- 観賞用、または装飾用の金属に対しては、本剤がかからないように注意してください。
- 飛沫の付着が心配されるような場所に関しては、変色が起こらないことを確認してください。



### 特長

- 安全性**：人および動物、水生動物への毒性が低く、高い安全性が確認されています。
- 効力**：忌避性がなく、食毒と接触毒で致死効果を発揮し、残効性があります。
- 臭い**：施工中の異臭もなく、残臭もありません。
- 飛散性**：フロアブル剤ですので、水希釈時の粉立ち、飛散の心配はありません。
- 忌避性**：ありません。



## 防カビ効果もある木部処理剤

モクボー

# オフティカル<sup>®</sup>

# 木部処理用20EC乳剤

## 製品の概要

有効成分	チアメトキサム(防蟻)	2w/w%
	シプロコナゾール(防腐)	2w/w%
	チアベンダゾール(防カビ)	4w/w%

剤型	乳剤	毒劇物取締法	非該当
外観	黄赤色澄明液体	改正建築基準法	シックハウス13 指定物質を 含みません
消防法	第4類第3石油類		

使用方法

- オプティガード<sup>®</sup>20EC 1ℓに対して水19ℓを均一に希釈した20倍希釈液を300mℓ/m<sup>2</sup>となるように木部に塗布または噴霧してください。
  - 希釈液は、調製したその日のうちに使い切ってください。
  - 他剤との混用は避けてください。
  - 水道水を使用してください。
  - 食品、食器、飼料、玩具、寝具、衣類、愛玩動物、家畜、観賞魚、植物、貴重品、美術品、楽器、電気器具等はあらかじめ移す、あるいは格納し、本剤がかからないようにしてください。
  - 観賞用または装飾用の金属に対しては、本剤がかからないように注意してください。
  - 飛沫の付着が心配されるような場所に関しては、変色が起こらないことを確認してください。

特長

**安全性**：人およびその他の動物、水生動物への毒性が低く、高い安全性が確認されています。


**効 力**：配合防蟻剤は、食毒と接触毒で致死効果を発揮します。また、配合3主成分は残効性に優れているため防蟻、防腐、防かび効果が期待されます。

**臭い**：低臭性で、施工中の異臭発生や残臭の心配はありません。

**飛散性**：乳剤ですので、水希釈時の粉立ち、飛散の心配はありません。

**忌避性**：オプティガード®ZTに比べると若干の忌避性があります。


(公社)日本しろあり対策協会認定  
(公社)日本木材保存協会認定



# モクボーオプティガード<sup>®</sup>とは? 人や環境にやさしい

商品名は、Optimum『最高の』とGuard『守る』から名づけられました。

## オプティガードの防蟻成分『チアメトキサム』の作用機構



## 使用上の注意

### 《使用に関して》

#### ① 使用開始前

- ラベルをよく読み、本剤の特長や注意事項、用法、用量を十分理解して使用してください。
- 病人、特異体質者、妊娠、乳幼児等は、薬剤のかからない場所に移動させるよう配慮してください。
- 食品、食器、飼料、玩具、寝具、衣類、愛玩動物、家畜、観賞魚、植物、貴重品、美術品、楽器、電気器具等はあらかじめ移す、あるいは格納し、本剤がかかるないようにしてください。
- 飛沫の付着が心配されるような場所に関しては、変色が起こらないことを確認してください。
- 食器にかかった場合は、水と中性洗剤でよく洗浄し使用してください。
- 穀物、特に米にかかった場合は、処分してください。
- 観賞用、または装飾用の金属に対しては、本剤がかかるないように注意してください。
- 保護具（長袖の作業衣、作業帽、保護メガネ、保護マスク、保護靴、ゴム手袋など）および使用する防除器具をあらかじめよく点検、整備し、作業の際にには保護具を必ず着用し身体の露出部を少なくし、薬剤を浴びないようにしてください。
- 通気の悪い場所で作業する場合には、局所排気装置を使用するなどして換気に十分注意してください。
- 本剤は、必要量だけ誤飲・誤食の懸念のない適切な器具に分取してください。
- 予想される事柄（かべの染・汚れなど）は、事前に施主の了解を得てください。

#### ② 使用中

- 本剤が庭木や草花にかかるよう注意してください。
- 桑に付着する恐れのある場所では使用をさせてください。
- ミツバチを放飼している地域では使用しないでください。
- 本剤処理の場合には、いつも身体を風上に置いてください。
- 散布（顆粒）機の圧力は、できるだけ低くし（5kg/cm<sup>2</sup>以下）、薬剤が不必要に広がらないように注意してください。

また風の強い場所での本剤の使用を避けてください。

#### ③ 使用後

- 直ちに石けん水で手や顔をよく洗い、うがいを行ってください。また、衣類は清潔なものに着替えてください。さらに、1日の作業終了後は必ず入浴、またはシャワーを浴びてください。
- 空容器は他に転用しないで、回収業者に渡すなど適切に処分してください。

### 《応急措置》

- 作業中に気分が悪くなったり、本剤を吸い込んで喉などの異常が見られた場合は、すぐに新鮮な空気のある場所に移動し、衣類を緩めて呼吸を楽にしてください（意識のある場合には水等でうがいをしてください）。症状によっては、医師の診断を受けてください。
- 身体に異常を感じた場合や誤って飲み込んだ場合には、直ちに本剤がネオニコチノイド系（チアニコチニル系）の殺虫剤であることを医師に告げて診断を受けてください。
- 皮膚の露出部に付着した場合には、すぐに石けんと水でよく洗い流してください。症状によっては医師の診断を受けてください。
- 目に入った場合には、直ちに大量の水で十分に洗眼してください（約10分）。症状によっては、医師の診断を受けてください。
- 衣類に付着した場合には、直ちに脱がせ、汚染した皮膚はすぐに石けんと水でよく洗い流してください。使用後の衣類は、他の衣類と区別して洗濯してください。
- 河川や池等に流入した場合には、直ちに警察および消防署に通報し、汚染拡大防止に努めてください。

### 《保管上の注意》

- 専用の倉庫（冷暗所）で保管してください。
- 食品、食器、飼料などと区分し、部外者や幼児、犬、猫などが侵入しないよう施錠しておいてください。紛失防止に対処するため、在庫状況、使用量が常時把握できるように管理してください。
- 使用後に残った薬剤は、必ず保管場所に戻し、確実に封入しておいてください。



大日本木材防腐株式会社

名古屋市港区千鳥一丁目3番17号

TEL. 052(661)1531 FAX. 052(661)3834

お問い合わせ